

Số: /HD-TTĐVTH

Dân Hòa, ngày tháng năm 2026

HƯỚNG DẪN
Biện pháp phòng trừ ốc bươu vàng hại lúa Mùa năm 2026

Qua kiểm tra thực tế đồng ruộng của cán bộ kỹ thuật Trung tâm ngày 18/06/2026, hiện nay trên địa bàn xã các hợp tác xã nông nghiệp gieo mạ mùa từ ngày 03- 08/6/2026 diện tích mạ 20 ha, đã tập trung làm đất lần 1 xong chuẩn bị công tác cấy lúa Mùa. Ốc bươu vàng (OBV) đã phát sinh và gây hại trên mạ và ruộng mật độ phổ biến 1 - 2 con/m², nơi cao 3 - 5 con/m², cục bộ trên các chân ruộng trũng, các vị trí đầu dòng dẫn nước, có nơi > 20 con/m².

Dự kiến trong thời gian tới, OBV sẽ gây hại trên diện tích lúa mới cấy, có thể gây hại nặng trên chân ruộng trũng, trên các ruộng đầu dòng nước, đầu cống. Chủ động phòng trừ và hạn chế sự gây hại của OBV đối với lúa Mùa 2026.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã hướng dẫn các biện pháp phòng trừ OBV như sau:

Để diệt trừ OBV an toàn và hiệu quả, ưu tiên áp dụng các biện pháp canh tác, biện pháp thủ công trên các diện tích mật độ OBV thấp. Trên các diện tích mật độ OBV cao, hạn chế OBV gây hại cần kết hợp cả biện pháp thủ công và hóa học để diệt trừ hiệu quả.

1. Sử dụng các biện pháp canh tác, biện pháp thủ công

- Làm đất bằng phẳng, tránh để những khu vực trũng nước trên ruộng.
- Bắt OBV và ổ trứng bằng tay, nên bắt sớm vào trước cấy 1 - 2 ngày.
- Làm rãnh thoát nước trên ruộng để thu hút OBV đến sống tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom bằng tay.
- Đặt lưới, phên tre chặn cửa mương nước vào ruộng, ngăn OBV xâm nhập và bắt dễ dàng. Nên đặt lưới sớm ngay từ đầu vụ đến khi thu hoạch.
- Cắm các cọc ở những chỗ ngập nước, mương kênh tưới để thu hút OBV đến đẻ trứng và thu gom thuận tiện.
- Điều tiết chế độ nước bằng cách rút nước định kỳ, giữ mực nước thấp 2-3 cm nhằm hạn chế ốc di chuyển, phá hại.
- Giai đoạn chuẩn bị làm đất nếu cây bừa kỹ, cây sâu thì có thể diệt được OBV hại lúa nằm vùi dưới ruộng.
- Sử dụng các loại thức ăn ưa thích của ốc là Sơ mít, lá đu đủ, lá khoai sọ, có thể bó thành bó nhỏ, hoặc rắc thành đùm đống dọc theo bờ ruộng để dẫn dụ ốc đến ăn sau đó thu gom.
- Sử dụng vôi bột để hạn chế OBV phát sinh hại lúa, liều dùng 20kg/sào.
- Có thể xử lý vôi kết hợp với bón lót lân vào giai đoạn chuẩn bị ruộng.

2. Biện pháp hóa học

- Những ruộng lúa có mật độ OBV cao nên sử dụng các loại thuốc hoá học. Thuốc có tác động xông hơi, vị độc, làm ức chế men hô hấp và trao đổi chất lượng cơ thể của OBV. Thuốc tiếp xúc với trứng, làm ung trứng, thối trứng, làm cho trứng không nở thành ốc con.

- Một số hoạt chất sử dụng trừ OBV như *Metaldehyde* (thuốc Bolis 12 GB, YelloW-K 12 GB, Ốc hạt hà lan, Helix 15 GB, ...), hoạt chất *Niclosamide* (thuốc Pazol 700WP, Dioto 250EC, Snail tagold 750 WP, Molluska 700WWP, Baycide 70WP), ...

Lưu ý: khi sử dụng thuốc hóa học diệt OBV, cần đọc kỹ và làm đúng hướng dẫn sử dụng trên bao bì; mang đầy đủ bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn; thu gom vỏ bao bì sau sử dụng đúng nơi quy định.

Trên đây là hướng dẫn biện pháp phòng trừ OBV hại lúa Mùa 2026. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đề nghị các HTX nông nghiệp, trưởng các thôn phối hợp với cán bộ kỹ thuật của Trung tâm tăng cường kiểm tra đồng ruộng, khuyến cáo, hướng dẫn các hộ dân phòng trừ OBV kịp thời, hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy xã; (để b/cáo).
- UBND xã; (để b/cáo).
- Chi cục TT và BVTV Hà Nội; (để p/hợp).
- Phòng Kinh tế; (để p/hợp).
- Các HTX nông nghiệp;
- Lưu VT, TTDVTH (01 bản).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thu Hằng